



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ (МОЗ України)

вул. М. Грушевського, 7, м. Київ, 01601, тел. (044) 253-61-94, E-mail: moz@moz.gov.ua,
web:http://www.moz.gov.ua, код ЄДРПОУ 00012925

Зл. 07 2015 № 3.22-58/3442-15/24716

На № 891 від 17.07.2015

Вх. № 725
14.08.15

**Міжнародний благодійний
фонд «Міжнародний Альянс з
ВІЛ/СНІД в Україні»**
вул. Димитрова, 5, корпус 10-А,
м. Київ, 03680

Міністерство охорони здоров'я України розглянуло Вашого листа щодо надання рекомендацій структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласним та Київської міської державних адміністрацій використовувати пегільований інтерферон, закуплений в рамках реалізації Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року за напрямом «Централізована закупівля медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С», для лікування пацієнтів із ко-інфекцією ВІЛ/ВГС в рамках реалізації проекту «Розширення доступу до ефективного лікування вірусного гепатиту С (ВГС) через моделі лікування на рівні громад для уразливих груп населення в умовах обмежених ресурсів України» (далі – Проект) та повідомляє.

Відповідно до даних Державного закладу «Центр статистики МОЗ України» у 2014 році в Україні кількість хворих на гепатит С становила 43 407 осіб. За оперативними даними регіонів України станом на березень 2015 року негайного лікування потребують 34 542 особи.

Згідно даних ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров'я України» кількість хворих на коінфекцію (ВІЛ/ХГС, ВІЛ/ВГС/ВГВ) становила 29 880 осіб, серед них 3 721 (12,5%) із ко-інфекцією ВІЛ/ХГС та 744 (2,5 %) із ко-інфекцією ВІЛ/ВГС/ВГВ хворих потребують негайного лікування.

Таким чином, згідно статистичних даних в Україні на теперішній час зареєстровано **73 287** хворих із вірусним гепатитом С, з них негайного лікування потребують **39 007** осіб.

Крім того, за інформацією головного позаштатного спеціаліста МОЗ України із спеціальності «Інфекційні хвороби» Голубовської О.А. хворі із ко-інфекцією ВІЛ/ХГС та особи, що вживають наркотичні речовини, за даними світової медичної літератури, переважно інфіковані 3 генотипом вірусу гепатиту С. Застосування пегільованих інтерферонів у цієї категорії хворих супроводжуються більш значущими небажаними побічними явищами, тому для

лікування таких хворих з метою підвищення ефективності та безпеки лікування рекомендовано використовувати безінтерферонові схеми лікування.

З урахуванням викладеного, та, враховуючи на сьогодні обмежене фінансування заходу щодо закупівлі медикаментів для хворих на вірусні гепатити В і С, МОЗ України вважає неможливим надавати перевагу у лікуванні будь яким категоріям хворих на вірусний гепатит С.

Заступник Міністра



Віктор ШАФРАНСЬКИЙ