

Вих. № 891
17.07.15

**Заступнику Міністра охорони
здоров'я України
Перегінцю І.Б.**

Шановний Ігорє Богдановичу!

МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні» (надалі – Альянс) висловлює Вам свою повагу та звертається із наступним.


Альянс, в рамках реалізації проекту «Розширення доступу до ефективного лікування вірусного гепатиту С (ВГС) через моделі лікування на рівні громад для уразливих груп населення в умовах обмежених ресурсів України» (далі Проект) за підтримки Глобального Фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією та спільно з центрами СНІДу в Україні, розпочав програму лікування новим сучасним препаратом СОВАЛДІ (софосбувір) у пацієнтів із ко-інфекцією ВІЛ/ВГС.

Відповідно до результатів міжнародних досліджень, ефективність лікування ВГС сягає 97% у разі застосування комбінації препаратів софосбувір, пегільований інтерферон та рибавірин. Для реалізації першого етапу програми було обрано Вінницьку, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Миколаївську, Полтавську, Харківську області та місто Київ. У зв'язку із нестачею пегільованого інтерферону, Альянс листом від 20.05.2015 № 607 звернувся до Міністра охорони здоров'я України із проханням підтримати Проект Альянсу та дозволити державним закладам охорони здоров'я, які залучені до реалізації Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, використати вже закуплений пегільований інтерферон. Оскільки відповіді МОЗ на зазначений вище лист не отримано, Альянс повторно звертається до Міністерства охорони здоров'я із переконливим проханням спрямувати в регіони рекомендації щодо необхідності, за можливості, комбінувати у схемах лікування гепатиту С препарати, отримані в рамках різних програм фінансування, враховуючи, що це значно підвищує насамперед ефективність лікування, а також забезпечує раціональне використання обмежених державних ресурсів. Задля цього державні та комунальні заклади охорони здоров'я можуть виділяти пегільований інтерферон, закуплений в рамках Державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів на період до 2016 року, а також обласних програм, для спільного впровадження програми

з лікування ВГС у пацієнтів із груп ризику до ВІЛ. Саме комбінована терапія із використанням препаратів прямої противірусної дії та пегільованого інтерферону дозволить значно скоротити строки лікування (із 48 до 12 тижнів) та в значній мірі підвищить ефективність терапії.

Сподіваємось, що спільними зусиллями Міністерства охорони здоров'я України та Альянсу, ми досягнемо успіху в контролі над епідемію вірусного гепатиту С в нашій країні.

З повагою,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a long, wavy horizontal line that ends in a small upward-pointing hook.

**Виконавчий директор
Клепиков А. О.**